



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA
Tél. (61) 24.06.51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : 92 F
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP : 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 14 DU 5 OCTOBRE 1984

COLZA

La levée des cultures est à présent quasi générale. Il s'agit maintenant de leur assurer la meilleure implantation possible.

RAVAGEURS

GROSSE ALTISE

Des sorties d'adultes, parfois importantes, sont déjà observées.

Surveiller attentivement les parcelles et traiter à l'aide de l'un des produits signalés dans notre dernier bulletin n° 13 du 10 septembre, lorsque 3 plantes sur 10 présentent des morsures.

Les colzas sont sensibles aux morsures d'adultes de Grosse altise jusqu'au stade 2 feuilles vraies.

LIMACES

Des attaques fréquentes sont signalées.
L'épandage de granulés peut s'avérer nécessaire. Consulter notre dernier bulletin.

DESHERBAGE

La suppression des mauvaises herbes est un facteur important d'une bonne implantation des cultures.

Les produits utilisables en post-levée sont pour la plupart des graminicides. Certains d'entre eux ont toutefois une action complémentaire sur dicotylédones.
Seul, le LONTREL est actif uniquement sur dicotylédones (laiterons, matricaires et anthémis).

P. 1. 18

TABLEAU DES HERBICIDES UTILISABLES
EN POST-LEVÉE DU COLZA

Mat i ères actives	Spécialités commerciales	Dose de spécia- lité à l'ha	Epoque d'application	Observations
Alloxydime- sodium	FERVIN	0,75 kg	Utilisable à tout stade du colza, de la levée au stade montaison des gra- minées.	L'adjonction d'huile (à 3 l/ha) est conseillée con- tre graminées vivaces.
Carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	Dès le stade 4 feuil- les du colza, jusqu'à 3 semaines avant re- prise de végétation.	Utilisable même sur sol gelé.
Carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	3,5 kg	Dès le stade 4 feuil- les du colza.	Action complémentaire sur quelques dicotylédones: véroniques, mourois, coquelicots.
Dalapon	nombreuses spécialités	3 kg	Dès le stade 2-3 feuilles du colza.	Utiliser avant la période des gelées.
3,6 D.C.P.	LONTREL S.F. 100	1 l	Quel que soit le stade du colza.	Utiliser sur mauvaises her- bes développées par t° > 10°. Actif sur laitrons, matricaires et anthémis.
Fluazifopbutyl	FUSILADE	1,5 l	Dès le stade cotylé- donnaire du colza, quel que soit son stade.	Utiliser très précocément, dès la levée des adventi- ces. L'adjonction d'huile (ACTIPLUS à 1 l/ha) est conseillée.
Propyzamide	KERB 50 W	1 kg	Dès le stade 3 feuil- les du colza, jusqu'à la reprise de végéta- tion.	Utilisable sur sol gelé. La dose peut être augmentée sur graminées vivaces (3 kg sur chiendent agro- pyrum).
Propyzamide + diuron	KERB-ULTRA	1,2 kg	Dès le stade 4 feuil- les du colza.	Action complémentaire sur quelques dicotylédones : sanves, ravenelles, stellai- res.
Sethoxydime	FERVINAL	2,5 l	Quel que soit le stade du colza.	L'adjonction d'huile SCHE- RING (3 l/ha) est conseil- lée pour lutter contre gra- minées vivaces.